

TABLEAU DES DÉLAIS DES IST



En l'absence de symptômes, il faut parfois un certain temps pour que les dépistages puissent détecter une IST. Avant de pouvoir faire un dépistage, consultez ce tableau pour savoir combien de temps il est recommandé d'attendre après une possible contamination.

	7 JOURS	2 SEMAINES	6 SEMAINES	2 MOIS / 8 SEMAINES	3 MOIS / 12 SEMAINES	AU-DELÀ DE 3 MOIS
VIH / SIDA			PRISE DE SANG TEST RAPIDE / AUTO-TEST			
HÉPATITE A			PRISE DE SANG			
HÉPATITE B				PRISE DE SANG		
HÉPATITE C					PRISE DE SANG TEST RAPIDE	
SYPHILIS					TEST RAPIDE	
HERPÈS GÉNITAL*						
HPV**						
CHLAMYDIA		PRÉLÈVEMENT (VAGINAL, ANAL OU PHARYNGÉ)				
GONORRHÉE	PRÉLÈVEMENT (VAGINAL, ANAL OU PHARYNGÉ) TEST URINAIRE					
TRICHOMONAS			PRÉLÈVEMENT (VAGINAL) TEST URINAIRE			

Herpès*: Le diagnostic de l'herpès est possible uniquement en cas de symptômes.

HPV**: Concernant le papillomavirus, l'apparition des symptômes peut se faire des mois, voire des années après la première contamination ! Pour l'utérus, le-la gynécologue fait systématiquement un frottis (remboursé par la Sécurité sociale) tous les 3 ans ou s'il-elle constate des lésions. Pour l'anus et le pénis, un dépistage ne sera fait qu'en cas de symptômes apparents.

TABLEAU DES TRANSMISSIONS DES IST



Ce tableau récapitule les pratiques à risque pour chaque Infection Sexuellement Transmissible (IST).

Quand se faire dépister ? À chaque changement de partenaire, en cas de doute, avant d'arrêter sa contraception, si votre (ex)partenaire est porteur d'une IST, régulièrement en cas de relations libres et avant une pose de DIU.

	PÉNÉTRATION VAGINALE	PÉNÉTRATION ANALE	FELLATION	CUNNINGUS	ANULINGUS	CARESSE SEXUELLE	EMBRASSER	ÉCHANGE DE SERINGUE	SNIFF	MÈRE / ENFANT
VIH / SIDA	●	●	*					●		●
HÉPATITE A					●					
HÉPATITE B	●	●	●	●			●	●	●	●
HÉPATITE C	●	●						●	●	●
SYPHILIS	●	●	●	●	●	●	●	●		●
HERPÈS GÉNITAL	●	●	●	●	●	●	●			●
HPV*	●	●	●	●	●	●				●
CHLAMYDIA	●	●	●	●	●	●				●
GONORRHÉE	●	●	●	●	●	●				●
TRICHOMONAS	●		●	●	●	●				●

- RISQUE FAIBLE
- RISQUE MOYEN
- RISQUE ÉLEVÉ
- RISQUE AVEC DU SANG***

* La personne faisant la fellation court un risque faible si elle reçoit du sperme en bouche et que ses muqueuses sont abîmées.

** Human Papilloma Virus

*** Lors de rapports sexuels non protégés et/ou traumatiques incluant la présence de sang (fisting, règles, lésions, etc.)